



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第1類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

日本薬局方 ペミロラストカリウム点眼液

アールPガード®点眼液

花粉などによる目のアレルギー症状に

ノアールPガード点眼液は…

●抗アレルギー成分「ペミロラストカリウム」を配合した「目のアレルギー症状の緩和」に効果を発揮する目薬です。

花粉シーズン中の症状軽減を目的とした場合、症状があらわれていなくても花粉飛散開始の1～2週間前からの使用をおすすめします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。

(5) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児。

(6) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み、強い異物感

(7) 眼球乾燥症候群(ドライアイ)の診断を受けた人又はそのおそれのある人。

(8) コンタクトレンズを装用している人。

(9) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるので、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

・片方の目だけに症状がある場合

・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合

・視力が低下した場合

・目やにの多い場合



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
目	充血、刺激感・しみる*、目やに、かゆみ*、痛み*

*目のまわりを含む

3. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

目のかすみ改善されない場合

【効 能】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

【用法・用量】

下記の1回使用量を点眼します。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上) 及び7歳以上の小児	1滴	2回(朝・夕)
7歳未満	使用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)点眼用에만使用してください。
- (5)用法・用量を厳守してください。
- (6)花粉など季節性アレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1～2週間前から、又は花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- (7)1週間位使用しても症状がよくなる場合、また、症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

〈使用方法〉

- 使う前に手をきれいに洗ってください。

			
下まぶたを軽く押し下げ、真上から1滴を点眼してください。	容器の先端が目やまつ毛に直接触れないようにしてください。また、使用後も容器の先端やキャップは清潔に取り扱ってください。	滴下した後、しばらくまばたきをせず、目を閉じておいてください。	使用後はキャップをしっかりと締めてください。

【成分・分量】8mL中

成 分	分 量	働 き
ペミロラストカリウム	8mg	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑え、目のアレルギー症状を緩和します。

添加物として、グリセリン、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 **03-5412-7393**
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号