

2015年7月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

下痢・食あたり・水あたりに

小粒赤玉はら薬

小粒赤玉はら薬は、古くから、止瀉（下痢止め）、健胃、整腸を目的とした和漢生薬を配合した胃腸薬で、下痢、食あたり、はき下しに穏やかな効きめをあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがある。)
 - (4) 高齢者。
2. 次の場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 5~6日服用しても症状がよくならない場合

用法・用量

次の量を、食後服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

(1包：30粒)

大人（15才以上）	30粒
11才以上15才未満	20粒
8才以上11才未満	15粒
5才以上8才未満	10粒
何れも1日3回を限度とし、水又は白湯にて服用する。		(裏面もお読みください。)

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

成分・分量 90粒(大人1日量)中

オウバク末	570mg
ゲンノショウコ末	900mg
ヨウバイヒ末	450mg
オウレン末	100mg
ゲンチアナ末	150mg
ショウキョウ末	75mg
ダイオウ末	75mg
添加物としてデヒドロ酢酸ナトリウム、サリチル酸、沈降炭酸カルシウム、寒梅粉、タルク、炭酸カルシウム、酸化チタン、アラビアゴム末、精製ゼラチン、赤色3号・黄色5号法定色素を含む。	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社

お客様相談窓口 ☎(076)435-0139

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175