

vitamin C ヘルスパンC錠 2000

第3類医薬品

13-5-A

vitamin C ヘルスパンC錠 2000 1日9錠 ビタミンC 2,000mg 配合

第3類医薬品

しみ・そばかす
日やけ・かぶれによる
色素沈着

水なしで服用できます

チュアブル
180錠

水なしで服用できる
グレープフルーツ味

明治薬品

このケースはお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

【使用上の注意】

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 次の診断を受けた人。フェニルケトン尿症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 消化器：吐き気・嘔吐 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、本製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 下痢 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、本製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法・用量

1日2～3回服用して下さい。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中で溶かすか、又はかきくだいて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回(朝夕)～ 3回(朝昼晩)
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

用法及び用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。用法・用量を守り、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意して下さい。

効能・効果

次の諸症状の緩和(しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着。 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血)ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

使用
期限

製造
番号

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
明治薬品株式会社 お客様相談室
電話：☎ 0120-53-3451
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

製造販売元 明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

vitamin C ヘルスパンC錠 2000 1日9錠 ビタミンC 2,000mg 配合

第3類医薬品

しみ・そばかす
日やけ・かぶれによる
色素沈着

水なしで服用できます

チュアブル
180錠

水なしで服用できる
グレープフルーツ味

明治薬品

第3類医薬品

ヘルスパンC錠 vitamin 2000C

成分・分量

成分	成人(15歳以上)1日量(9錠)中
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム〕	1,000mg 1,124.79mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg

添加物として、セルロース、乳糖水和物、無水ケイ酸、還元麦芽糖水アメ、アスハルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、トコフェロール、香料

成分・分量に関連する注意

(1)本剤の服用により尿及び大便の検査値に影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせ下さい。

(2)リボフラビンにより尿が黄色になる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)瓶内に乾燥剤が入っていますが、服用しないで下さい。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話0120-149-931(フリーダイヤル)

