



しみ・そばかす

日やけ・かぶれによる 色素沈着

1日9錠 (水なしで服用できます)

ビタミンC 2,000mg 配合

チュアブル

135錠

◀ ここからお切りください。開封後はチャックをしっかりと閉めください。

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。

販売名：ヘルスパンC錠2000 ビタミンC剤

【効能・効果】

第3類医薬品

次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

1日2～3回服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中で溶かすか、又はかみくだいて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回(朝夕)～ 3回(朝昼晩)
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

【成分・分量】

成分	成人(15歳以上)1日量(9錠)中
ビタミンCとして 〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム〕	2,000mg 1,000mg 1,124.79mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg

添加物として、セルロース、乳糖水和物、無水ケイ酸、還元麦芽糖水アメ、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、トコフェロール、香料

【成分・分量に関連する注意】

- (1) 本剤の服用により尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。
- (2) リボフラビンにより尿が黄色になる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 袋内に乾燥剤が入っていますが、服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

お客様相談室

☎ 0120-53-3451

平日 9:00～17:00



【使用上の注意】 相談すること

- (1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 次の診断を受けた人。フェニルケトン尿症
- (2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- (3) 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- (4) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

使用期限／製造番号

