

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

消炎鎮痛パッピング

コリアフターパッピングF温感

40枚入(8枚入×5袋) [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量10g]

【特長】

- サリチル酸グリコールとI-メントールが炎症を抑えて痛みをやわらげ、トコフェロール酢酸エステルとトウガラシエキスの働きで患部の血行を促進し、日々のつらさを改善します。
- 伸縮性がよく、肌にピッタリとフィットします。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・痛み
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

ここを
押して
下さい。

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1~2回患部に貼付して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとてから使用して下さい。
- (5)打撲、捻挫にははがひいてから使用して下さい。
- (6)入浴の1時間前には、はがして下さい。また入浴後は30分位してから使用して下さい。
- (7)薬剤にふれた手指はよく洗って下さい。

【成分・分量】 (膏体100g中)

成 分	分 量	は た ら き
サリチル酸グリコール	1.4g	炎症を抑えます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行をよくします
I-メントール	0.3g	痛みをやわらげます
トウガラシエキス	0.075g (日局トウガラシ 3.75g相当量)	局所の血管を拡げ、血行をよくします

添加物：ゼラチン、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、赤色106号、その他2成分含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)未使用分はもとの袋に入れ、チャックをきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。

ご相談窓口

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社 ☎(0736)64-2567
時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸柄1229番地

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931



使用期限

製造番号

4 987450 002098

