ミミトン鼻炎カプセル

第②類医薬品

くしゃみ
鼻みず
鼻づまり
のどの痛み
頭重

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先
電話:0120-149-931
(フリーダイヤル)

鼻炎
MIMITON Rhinitis Capsule
第②類医薬品
18 カプセル (6日分)
くしゃみ・鼻みず・鼻づまり

成分・分量 3カプセル（成人1日量）中

成 分	分 量	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をやわらげます。
塩酸プソイドエフェドリン	90mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血や腫れをおさえ、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.42mg	鼻の粘液の分泌を調整し、鼻みずの過剰な分泌をおさえます。
グリチルリチン酸二カリウム	45mg	鼻粘膜の腫れや充血をしずめ、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	90mg	頭重をやわらげます。

添加物として乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料（酸化チタン）、プルランを含む。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

1日3回なるべく空腹時をさけ、4時間以上の間隔をおいて服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

⚠ 注 意

1. 次の人は服用しないで下さい
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の症状のある人。：前立腺肥大による排尿困難 (3)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
3. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。：高熱、排尿困難、むくみ (8)次の診断を受けた人。：緑内障、腎臓病 (9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
4. 服用に際しては、説明書をよく読んで下さい
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい

WAKI ワキ製薬株式会社
製造販売元
〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
お問い合わせ先
〒635-0082 奈良県大和高田市本郷町9-17

紙：箱

開け口 ▼

鼻炎
MIMITON Rhinitis Capsule
第②類医薬品
18 カプセル (6日分)
くしゃみ・鼻みず・鼻づまり

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり 第②類医薬品

4 573507 871641

使用期限

製造番号

元龍栄養 TIME NATURE

急性・アレルギー性鼻炎 第②類医薬品

鼻炎

18 カプセル (6日分)

鼻炎による諸症状の緩和に

塩酸プソイドエフェドリン配合

MIMITON Rhinitis Capsule

ミミトン鼻炎カプセル