

△【使用上の注意】 ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は中止する  
 用可能性があるので、直ちに服用を中止し、  
 この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売  
 者に相談すること

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 胃部不快感     |

2.服用後、次の症状があらわれることがあるの  
 で、このような症状の持続又は増強がみられた場  
 合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬  
 剤師又は登録販売者に相談すること（下項）  
 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合  
 は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師  
 又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：肌あれ、に  
 せび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、湿疹、  
 皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目  
 のかゆみ「ただし、これらの症状について、  
 1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合  
 は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の  
 場合はビタミンB<sub>2</sub>の補給：肉体的疲労時、妊  
 娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本（50mL）  
 を1日1回服用してください

【成分・分量】1本（50mL）中 リボフラビン  
 ビタミンナトリウム（ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エ  
 ステル）30mg、ピリドキシン遊離塩（ビタミン  
 B<sub>6</sub>）50mg、ニコチン酸アミド600mg、チアミ  
 ン衍化物（ビタミンB<sub>1</sub>衍化物）10mg、コイ  
 ニンエキス150mg（コイニンとして  
 1950mg）

添加物：エリスリトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、ク  
 エン酸Na、スクロース、アセスルファムK、香料  
 037RELJA

**肌あれ・にきび  
 口内炎** ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>  
 コイニンエキスを配合

**ステラスBB  
 ドリンクライト**

*Light*  
**1.5<sup>1びん</sup> kcal**  
**疲れたお肌に**

50mL

（ソルカタフェイン）第3類医薬品

製造販売 中外医薬生産株式会社  
 三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

販売名

ステラスBBドリンクライト  
 ビタミンB<sub>2</sub>主薬製剤

【保管及び取扱上の  
 注意】

(1) 直射日  
 光の当たらない涼し  
 い所に保管すること。  
 (2) 小児の手の届か  
 ない所に保管するこ  
 と。(3) 他の容器に入  
 れ替えないこと（服用  
 の原因になったり品  
 質が変わる。）。(4) 使  
 用期限を過ぎた製品  
 は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、  
 沈殿を生じることがあります。よく振って  
 から服用してください。

本剤の服用により尿が黄色くなることが  
 ありますが、ビタミンB<sub>6</sub>リン酸エステル  
 によるものですので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200  
 受付時間：9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

ガラス：ピン 金属：キャップ

製造番号

使用期限

4

987307520331

