

△【使用上の注意】 ■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。1ヵ月以上服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和、改善に、1.口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、咽喉炎、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ、1.など、これらの症状に、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。●次の場合のビタミンB₂の補給(肉は煮かき、生魚、卵、肉、牛乳、牛乳製品の摂取を減らす)。

【用法・用量】成人、1ヵ月間の1日1回(50mL)を1日1回服用してください。

【成分・分量】1本(50mL)中、リボフラビン(ビタミンB₂)ナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)30mg、ピリドキシン(ビタミンB₆)50mg、ニコチン酸アミド(ナイアシン)50mg、チアミン(ビタミンB₁)10mg、コイニシン(ビタミンB₁₂)10mg、コイニシンエキス150mg(コイニシンとして150mg)。

※成分表示：リボフラビン、ピリドキシン、チアミン、ナイアシン、コイニシン、コイニシンエキス、アセチルサリチル酸、香料、(50mL)中。

疲れたお肌に

ノンカフェイン

ラパール
Vitamin
B₂
ドリンクライト

肌あれ
にきび
口内炎

1.5kcal
1びん

ビタミンB₂・B₆
コイニシンエキス

50mL 第3類医薬品

製造販売元



中外製薬生産株式会社
三重県伊賀市伊賀7-5-5

販売名

ラ(ール)B₂ドリンクライト
ビタミンB₂主薬製剤

【保管及び取扱上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(服用の原因になりたり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、アレルギーを生じることがあります。よく振ってから服用してください。

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、ビタミンB₂リン酸エステルによるものですので心配ありません。

副作用報告数/総消費量 0.0120-149-931

お客様相談室 ☎095-21-3200
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ガラス：ビン 金 属：キャップ

製造番号

使用期限

4

987307520386

