

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

くみずむし・たむし用薬

エプールU10クリーム

第2類医薬品

硬くなったかかと等の水虫は、角質層が他の部分より厚く薬が浸透しにくくなっています。
抗菌成分+尿素10%が配合されたエプールU10クリームは1日1回の使用により、角質層の深部まで浸透し水虫菌をしっかり殺菌します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)乳幼児。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)患部が顔面又は広範囲の人。

(5)患部が化膿している人。

(6)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

(7)妊婦又は妊娠している可能性のある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合、又は、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

裏面もお読みください。

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】（100g中）

テルビナフィン塩酸塩……1.0g 尿素……………10.0g
リドカイン……………2.0g ジフェンヒドラミン ……1.0g
グリチルレチン酸……………0.1g

添加物としてプロピレングリコール、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セバシン酸ジエチル、カルボキシビニルポリマー、パラベン、トリエタノールアミン、グリシン、香料を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

水虫治療のポイント

- 患部はいつも清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。
- 水虫菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。
- かゆみ等がなくなっても、再発することがあるためしばらくの間は根気よく治療を続けましょう。
- 患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

〒930-2221 富山県富山市今市324番地

電話番号 076-435-0878

（土、日、祝日を除く 9：00～17：00）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売元

新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地

製造
販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142