

ペリソナEXクールスプレー

スプレー式鎮痛消炎剤 第2類医薬品



△使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) せんそくを起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している部位

3. 長期連用しないこと

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 痢などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

発売元 日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1

製造 前田薬品工業株式会社

販売元 富山県富山市向新庄町1丁目18番47号

お客様相談室

☎ 076-482-4088

9:00~17:00 土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



キャップ
ボタン
フィルム

M04

金属：缶

【用法・用量】

1日4回を限度として、適量を患部に噴霧又は塗布する。

【用法・用量に関する注意】

(1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用されること。(2) 11歳未満の小児に使用させないこと。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 顔に向けて噴霧しないこと。(5) 大量・広範囲には使用しないこと。(6) 外用にのみ使用し、吸入しないこと。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用すること。(7) 使用前によく振とうすること。(8) 患部まで5~10cmの距離で容器を上向きにして噴霧すること。(9) 同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないこと。(10) 薬剤噴霧後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。(11) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと。

【成分】 180mL中 インドメタシン 0.54g, l-メントール 1.62g (ただし原液 1mL中 インドメタシン 10mg, l-メントール 30mg) 添加物：クロタミトン、ラウリン酸マクロゴール、ミリスチン酸イソプロピル、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、LPG、DME

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) ファンヒーターなど暖房器具の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。(3) 小児の手の届かない所に保管すること。(4) 本剤がメガネ・アクセサリー等の金属類、衣類、床や家具の塗装面等に付着すると、着色や変質があるので、付着しないよう注意すること。(5) 火気に近づけないこと。

●使用期限、製造番号は缶底に記載

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

① 火や火気の近くで使用しないこと。② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③ 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④ 火の中に入れないこと。⑤ 使い切って捨てること。

高压ガス : LPG, DME

◆ガス抜きキャップ付き(ガス抜きの方法)

① 缶からキャップを外し、スプレーボタンを取り外します。② 布や新聞紙などを敷いた平らな所にキャップを伏せて置き、本体を逆さにしてキャップの天面中央の穴に強く押し込みます。③ 噴射音が完全に消えるまで放置した後、市町村等で定められた方法により廃棄してください。

◆ガス抜き時の注意事項

● 必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。● 本品のキャップ以外は使用しないでください。● ガス抜きしている間は、ガスと一緒に薬液が噴射される恐れがありますので、顔を近づけないでください。

【内容量】 180mL

火気厳禁

第一石油類 54mL 水溶性 危険等級II



4