

ひび・あかぎれ治療薬

ケラチナミン[®] ヴィビエイド

皮膚の乾燥は、寒さなどによる血行不良や皮脂分泌低下により起こります。さらに家事・育児などでの水仕事や、保湿が十分にできない状態が続くと、皮膚表面に「ひび」を生じたり、それが悪化して炎症を伴う「あかぎれ」を引き起こしたりします。

＜ひび・あかぎれを治し、健やかな皮膚へ＞

ケラチナミン[®] ヴィビエイドをお使い頂きますと、アラントインやパンテノールの組織修復作用、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)の血行促進作用、グリチルレチン酸の抗炎症作用、グリセリンの保湿作用といった4つの作用が働き、つらい「ひび・あかぎれ」を治していきます。また、血行不良や乾燥に働きかけることで「ひび・あかぎれ」をくり返さない健やかな皮膚に改善していきます。

〔ヒビ修復に4つのアプローチ〕



(イメージ図)

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ

成分・分量(100g中)

成分・分量		働 き
アラントイン	2.0g	ひび割れた皮膚組織を修復します。
パンテノール	5.0g	皮膚組織の修復に役立ちます。
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	皮膚の血行を改善します。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。
グリセリン	40.0g	皮膚を保湿し、潤いを与えます。

[添加物]ヒアルロン酸Na、ワセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ジメチルポリシロキサン、トリイソオクタン酸グリセリン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、リン酸二水素K、パラベン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造
販売元

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

