

C529

販売名：リョウシンJV錠 第3類医薬品

保管及び取り扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 4.ビンの中の詰め物は、開封後に捨ててください。詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣の欠け)が生じることがありますので、取り扱いには注意してください。(詰め物は、錠剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- 5.ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。
- 6.服用の都度ビンのキャップをしっかりと閉めてください。(吸湿すると品質が変わることがあります)
- 7.錠剤は濡れた手で扱わないでください。(糖衣錠がけたり変色の原因となります)
- 8.使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 9.開封後は、品質を保つ意味で開封日から6ヵ月以内の服用を目安にしてください。

お問い合わせ 株式会社富山常備薬
☎ 0120-309-093
受付時間：9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2番25号
発売元 株式会社富山常備薬
富山県富山市丸の内1-8-17

開封年月日

年 月 日

【成分・分量】3錠(1日最大服用量)中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体)	109.16mg (100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500μg (100mg)
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (dlt-αトコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg (100mg)
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマーオリザノール	10mg

添加物として、乳酸Ca水和物、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セラセフェート、セルロース、バレイショデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、アラビアゴム末、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、酸化チタン、リポフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含有する。

【効能・効果】

- ・次の諸症状の緩和：筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」
- ・次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～3錠	1回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
11歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- 1.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2.用法・用量を厳守してください。

AS4145250213

第3類医薬品

リョウシンJV錠

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

第3類医薬品

ひざ・腰・肩などの

318分 93錠

関節神経痛

飲んで効く医薬品

リョウシンJV錠

有効成分

ビタミンB₁・B₆・B₁₂製剤

フルスルチアミン
ピリドキシン
シアノコバラミン
トコフェロール
パントテン酸カルシウム
ガンマーオリザノール

ビタミン

B₁ B₆ B₁₂

富山常備薬

使用期限

製造番号



紙箱




詰め物



4 580544 060051

服用前に、この説明文をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

軟便、下痢、便秘

- 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 5.服用後、生理が予定より早くなり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。