C511

結婚式のスピーチ・会議の発表に　第2類医薬品

人前で話す時の緊張をしずめる **アガラン錠**

販売名：アガラン

18錠 6回分

緊張による疲れの緩和に　天然生薬5種配合

神経の緊張をしずめるカノコ草エキスなどの天然生薬5種類を配合した人前で話す時の緊張をしずめる生薬製剤です

特　長

1．言葉が出ない結婚式のスピーチ・大きな会議の発表などでの緊張感をしずめます
2．面接試験・初めてのデート・ピアノの発表会などでのドキドキする緊張感をゆるめます
3．有効成分として天然生薬5種類だけを配合しています
4．緊張からくる疲れをやわらげます
5．携帯しやすい1回分3錠入アルミ袋包装

用法・用量

成人（15歳以上）、1回**3錠**を**1日2回**まで服用していただけます。15歳未満は服用しないで下さい。

効能・効果

緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静、左記に伴う疲労倦怠感・頭重の緩和

販売元　**日本臓器製薬**
大阪市中央区平野町4丁目2番3号
お客様相談窓口　☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00～17:00

製造販売元　**大峰堂薬品工業株式会社**
奈良県大和高田市根成柿574

副作用被害救済制度　0120・149・931

保管及び取扱上の注意（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい（2）小児の手の届かない所に保管して下さい（3）他の容器に入れ換えないでください。誤用の原因になったり品質が変わることがあります（4）使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

成分　1包（3錠）中　カノコソウエキス130mg（神経の緊張をしずめる作用があります）トケイソウ乾燥エキス50mg（神経をリラックスさせる効果があります）チョウトウコウ乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ニンジン乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ソウ乾燥エキス15mg（緊張による疲労倦怠感を緩和します）

添加物　賦形剤（デンプン、乳糖）、結合剤（ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、セルロース）、滑沢剤（ステアリン酸Mg、CMC-Ca）、着色剤（タール）、コーティング剤（ヒプロメロース、セルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、カルナウバロウ）

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

結婚式のスピーチ・会議の発表に

人前で話す時の緊張をしずめる **アガラン錠**　第2類医薬品　18錠 6回分

開け口

人前で話す時の緊張をしずめる **アガラン錠**

18錠 6回分

第2類医薬品

実物大

天然生薬5種配合

人前で話す時の緊張をしずめる **アガラン錠**　使用期限　製造番号

4 987174 722012

第2類医薬品

紙

AS-3

効能・効果　緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静、左記に伴う疲労倦怠感・頭重の緩和

用法・用量　成人（15歳以上）、1回3錠を1日2回まで服用していただけます。15歳未満は服用しないで下さい。

成分　1包（3錠）中　カノコソウエキス130mg（神経の緊張をしずめる作用があります）トケイソウ乾燥エキス50mg（神経をリラックスさせる効果があります）チョウトウコウ乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ニンジン乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ソウ乾燥エキス15mg（緊張による疲労倦怠感を緩和します）

添加物　賦形剤（デンプン、乳糖）、結合剤（ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、セルロース）、滑沢剤（ステアリン酸Mg、CMC-Ca）、着色剤（タール）、コーティング剤（ヒプロメロース、セルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、カルナウバロウ）

保管及び取扱上の注意（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい（2）小児の手の届かない所に保管して下さい（3）他の容器に入れ換えないでください。誤用の原因になったり品質が変わることがあります（4）使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい

販売元　**日本臓器製薬**
大阪市中央区平野町4丁目2番3号
お客様相談窓口　☎06・6222・0441
土・日・祝日を除く 9:00～17:00

製造販売元　**大峰堂薬品工業株式会社**
奈良県大和高田市根成柿574

副作用被害救済制度　0120・149・931

関係部位

症状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
（1）医師の治療を受けている人
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）胃腸の弱い人
（4）過去にアレルギー症状を起こしたことがある人
2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
関係部位　症状
皮膚　発疹・発赤、かゆみ
消化器　吐き気・嘔吐、食欲不振
3．5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
4．長期連用しないで下さい
5．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
6．服用前後は、車の運転など危険を伴う機械の操作をしないで下さい
7．小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい
8．1日服用量を守って下さい
9．本剤を服用する場合、次の医薬品を服用しないで下さい
他の鎮静薬、催眠薬、抗不安薬
10．服用に際して、他の医薬品を併用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
11．2～3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
12．4～5日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

保管及び取扱上の注意（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい（2）小児の手の届かない所に保管して下さい（3）他の容器に入れ換えないでください。誤用の原因になったり品質が変わることがあります（4）使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

成分　1包（3錠）中　カノコソウエキス130mg（神経の緊張をしずめる作用があります）トケイソウ乾燥エキス50mg（神経をリラックスさせる効果があります）チョウトウコウ乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ニンジン乾燥エキス25mg（神経の興奮をしずめる働きがあります）ソウ乾燥エキス15mg（緊張による疲労倦怠感を緩和します）

添加物　賦形剤（デンプン、乳糖）、結合剤（ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、セルロース）、滑沢剤（ステアリン酸Mg、CMC-Ca）、着色剤（タール）、コーティング剤（ヒプロメロース、セルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、カルナウバロウ）

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい