

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

しみ・そばかすの緩和、肉体疲労時のビタミンC補給に

DHC シスビタホホワイトC

<ビタミンC主葉製剤>

第3類医薬品

DHCシスビタホホワイトCは、メラニンの生成を抑え、日やけなどによる色素沈着を緩和するビタミンCを1,000mg(大人1日量)配合したお薬です。さらに、L-システインや、ビタミンE、ビタミンB₂、ビタミンB₆、パントテン酸カルシウムが、皮膚の効率的な代謝を助けます。カロリーや糖分が気になる方も使いやすいフィルムコート錠です。



使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

●次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

●次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

●次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

■ 用法・用量

1日2回食前又は食後に服用してください。

大人(15才以上)・・・・・・ 1回2錠

小児(7才以上15才未満)・・・ 1回1錠

7才未満は服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】

7才以上15才未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

4錠(大人1日量)中

アスコルビン酸(ビタミンC)	1000mg
L-システイン	160mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	30mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg
酢酸d- α -トコフェロール(ビタミンE)	25mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物として、トウモロコシデンブ、二酸化ケイ素、乳酸Ca、無水ケイ酸、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、マクロゴール、酸化チタン、グリセリン、カラメル、カルナウバロウを含有します。

【成分に関連する注意】

1. ビタミンB₂は、体内に吸収されるその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色になることがあります。
2. ビタミンCは、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。従って、医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせてください。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するためにいれてありますので、フタを開けた後は捨ててください。ただし、乾燥剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。
6. 容器の中の乾燥剤は服用しないでください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 <http://www.dhc.co.jp>