

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。


あゆみローヤルゴールド

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂ 製剤

特 徴

- ひざなどの関節痛や腰痛、坐骨、肋間などの神経痛の緩和に
フルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）は腸で吸収しやすく、体内で活性型ビタミンB₁に変換され、関節痛、腰痛、神経痛の症状を緩和します。
フルスルチアミンを補助するビタミンB₆、B₁₂をバランスよく配合することで、優れた効果を発揮します。



●眼精疲労に

眼球の水晶体の主原料は、タンパク質の一種で、ビタミンB₆はタンパク質の代謝と免疫機能を高めます。また、ビタミンB₆、B₁は視神経の働きを強化し、ビタミンB₁₂は視神経の機能を正常に保つ働きがあり、効果的に疲労を緩和します。

●肉体疲労時の栄養補給に

三大栄養素（炭水化物、脂質、タンパク質）を効率よくエネルギーに変える助けをし、疲れたカラダを改善します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

●次の諸症状の緩和

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

●次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1 回 量
15歳以上	2 錠
7歳以上15歳未満	1 錠
7歳未満は服用しないこと	

いずれも1日1～2回朝夕に服用する。



用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


成分・分量 1日量（4錠中）

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩（V.B ₁ 誘導体）	75mg
ピリドキシン塩酸塩（V.B ₆ ）	50mg
シアノコバラミン（V.B ₁₂ ）	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、バレイショデンプン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号（タートラジン）を含む。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先

連絡先 株式会社ジェイ・メディックス お客様相談室
住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7
博多センタービル10F
電 話 0120-793-044
受付時間 年中無休 24時間受付

【発売元】

株式会社ジェイ・メディックス
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7
博多センタービル10F

【製造販売元】

ワキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）