

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第②類医薬品

品目番号 奈3巻82-237

鎮咳去痰薬

せき・たん・ぜんそくに

ホルタシストローチ

特徴：このトローチはせきやぜんそくに効果のある成分と口中殺菌成分が含まれています。かまずに口の中で溶かしていると薬効成分が溶け出し、口中の粘膜に直接刺激を与えたり、粘膜より吸収されて局所的に効果を現しますのでせきやたん、ぜんそくを鎮める働きがあります。

また、口中殺菌成分は、口中細菌の発生をおさえ、のどののれや痛みを防ぐことができます。

●dl-メチルエフェドリン塩酸塩

せき及びぜんそく性のせきのせきどめとして効果を発揮します。

●塩化セチルピリジニウム

口中殺菌作用があり、口中を清潔に保ち、のどの炎症によるのどののれや痛みを防ぎます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
- (7) 次の診断を受けた人。

高熱
心臓病、高血圧、糖尿病、
甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、	かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、	食欲不振
精神神経系	めまい	

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症	状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発 赤等が持続したり、急激に悪化する。	
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛 があらわれ、徐々に強くなる。	

3. 5～6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

せき、ぜんそく及びたん。
のどの炎症による声がれ・のどののれ・のどの不快感・のどの痛み・のどののれ。

【用法・用量】

大人（15歳以上）…………… 1日6錠
1回1錠、2時間以上の服用間隔をおき、
口の中でかまずにできるだけゆっくりとか
して用いる。

【用法・用量に関連する注意】

1. 本剤はトローチ剤です。かみ砕いたり、そのまま飲み込んだりしないでください。
2. 小児には服用させないでください。

【成分・分量】 1日量（6錠）中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 … 37.5 mg

塩化セチルピリジニウム …………… 6 mg

賦形剤 キキョウ末

賦形剤 セネガ末

添加物として白糖、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Mg、 ℓ -メントール、香料、プロピレングリコール、乳糖水和物及び黄色5号を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 成分中のキキョウ末、セネガ末により錠剤の表面に黒～褐色の細かい斑点を認めることがあります、品質に変わりありません。



【問い合わせ先】

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035：奈良県大和高田市旭南町2-25

電話：0745-22-4151

受付時間：9:00～16:00

（土・日・祝日を除く）

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25

BR3537120910