

指定医薬部外品

L-システイン

TORETERU

トレテル

L-システイン

TORETERU

トレテル

指定医薬部外品

アスコルビン酸(ビタミンC)
ニコチン酸アミド
リボフラビン(ビタミンB₂)

サロン専売 30日分180錠

使用期限 製造番号



指定医薬部外品

販売名:ラークシー
《成分・分量》1日量(6錠)中

アスコルビン酸(ビタミンC) …… 500mg
L-システイン …… 160mg
ニコチン酸アミド …… 60mg
リボフラビン(ビタミンB₂) …… 12mg

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム末、ゼラチン、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca及びカルナウバロウを含有する。

《成分・分量に関する注意》
本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。

《用法・用量》
成人(15歳以上)1回2錠、1日3回、毎食後服用してください。15歳未満は服用しないでください。

《用法・用量に関する注意》用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

指定医薬部外品

L-システイン

TORETERU

トレテル

《効能・効果》

- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防:肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

《使用上の注意》【相談すること】

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位:消化器(症状:吐き気・嘔吐)
皮膚(症状:発疹・発赤)

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

3.1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

《保管及び取扱い上の注意》

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり品質が変わることがある。)

発売元

モアリッチ株式会社

和歌山県和歌山市新中通二丁目25番地
お客様相談口: ☎ 0120-497636

製造販売元

寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2番25号

MADE IN JAPAN

3800