

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠ 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - しばらく服用しても症状がよくなる場合。

■効能・効果：食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）

■用法・用量：成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を食前に服用して下さい。

● 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。● 用法・用量を守って下さい。

販売名：ソルマック5

■成分 1本（50mL）中
ウコンエキス200mg（鬱金2000mgに相当）、コウシンエキス83.3mg（紅参333.2mgに相当）、ソヨウエキス37mg（蘇葉333mgに相当）、
チョウジ油（丁子油）5mg、グリチルリチン酸二カリウム7.2mg
添加物：グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポピドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、パニン、香料
● 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

ソルマック®

飲む前・食べる前に サキソミ

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<http://www.taiho.co.jp/>

使用
期限

製造
番号

50mL L1401
ガラス：瓶
金属：キャップ

