

服用に際してはラベルをよく読むこと

⚠ 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 効能・効果: 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)
- 用法・用量: 成人(15歳以上) 1日1回1本(50mL)を食前に服用して下さい。
● 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。● 用法・用量を守って下さい。

販売名: ソルマック5

■成分 1本(50mL)中
ウコンエキス200mg(鬱金2000mgに相当)、コウシンエキス83.3mg(紅参333.2mgに相当)、ソヨウエキス37mg(蘇葉333mgに相当)、
チョウジ油(丁子油)5mg、グリチルリチン酸二カリウム7.2mg
添加物: グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポピドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、パニン、香料
● 生薬成分を含むため、沈澱を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

ソルマック®

飲む前・食べる前に

サキソミ

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

大鷲薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

TAIHO

使用
期限

製造
番号

50mL L1902

ガラス:瓶
金属:キャップ

