

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 乗り物酔いの予防と緩和に

# センバアドリンク

〈乗物酔い薬〉

飲みやすい グレープフルーツ風味

第2類医薬品

販売名:センバア ドリンク

◆センバア ドリンクは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにします。

◆旅行の途中で気分が悪くなった場合でも、その場で服用できる、服用しやすい液剤です。



## 使用上の注意

必ず読むこと!



### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)



## 相談すること



- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
緑内障、心臓病

- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症状            |
|-------|---------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 精神神経系 | 頭痛            |
| 泌尿器   | 排尿困難          |
| その他   | 顔のほてり、異常なまぶしさ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症状  |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。   |

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

## 効 能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛

## 用法・用量

次の量を服用してください。乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回1本を服用してください。

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。

| 年 令   | 1回量  | 服用回数   |
|-------|--|--------|
| 11才以上 | 1本(20mL)  | 1日2回まで |
| 11才未満 | 服用しないこと  |        |

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児(11才～14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成 分

1本(20mL)中

| 成 分             | 分量     | はたらき                             |
|-----------------|--------|----------------------------------|
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2.6mg  | 嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気・頭痛をおさえます。 |
| スコポラミン臭化水素酸塩水和物 | 0.16mg | 自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・吐き気をおさえます。     |

添加物：D-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## 乗物酔いを避けるために、次の点にもご注意ください

前夜は十分な睡眠を心がけましょう。



気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。



飲みすぎや食べすぎは避けましょう。



適度なおしゃべりで気分よくすごしましょう。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電 話 03-3985-1800  
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)