

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

〈痔疾用薬〉

ちの痛み・はれ・かゆみに

第②類医薬品

フェロテナス軟膏A

フェロテナス軟膏Aは、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸など7種の有効成分を配合した痔疾用軟膏で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

〔用法・用量〕

適量を取り肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。

〔成分・分量〕

100g 中

はたらき	成 分	分 量
痔の痛みとかゆみをおさえます。	リ ド カ イ ン	3.0g
痔のはれと出血をおさえます。	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
患部の殺菌消毒をおこないます。	クロルヘキシジン塩酸塩	0.5g
痔の炎症とかゆみをおさえます。	ジフェンヒドラミン	0.5g
痔の炎症を抑え、傷口の回復を早めます。	ア ラ ン ト イ ン	1.0g
痔の炎症をおさえます。	グリチルレチン酸	0.3g
血液の流れを良くし、うっ血をおさえます。	トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物として白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミリスチン酸オクチルドデシル、2-エチルヘキサン酸セチル、モノステアリン酸グリセリン、BHT、ユーカリ油を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。

痔治療のポイント

1. トイレでは無理にいきまず3分以内を心がけましょう。排便後は温水便座やぬるま湯で洗うなど、肛門を清潔にしましょう。ペーパーで強くこすらないようにしましょう。



2. 便秘をよくするために規則正しい生活と運動をしましょう。野菜や繊維質を多くとりお酒や刺激物をひかえましょう。



3. 患部を清潔にするため毎日の入浴を心がけましょう。入浴中は、おしりに負担のないリラックスした姿勢で。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。
奥田製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 (06)6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>