

効能・効果 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

用法・用量

1錠ずつ2錠までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。ただし、2時間以上の服用間隔をおいてください。

大人(15才以上)及び
5才以上の小児

1回2錠  

1日
3~6回

5才未満

服用しないこと

※1度に2錠を口中に含まず、1錠ずつなめてください。

●定められた用法、用量を厳守してください。●5才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。●かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

成分・分量 12錠中

セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)

6mg

添加物として還元水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、塩化Na、DL-リンゴ酸、カラメル、銅クロロフィリンNa、l-メントール、D-ソルビトール、香料含有

⚠ 使用上の注意

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。(1) 服用後、次の症状があらわれた場合〔皮ふ〕発疹・発赤、かゆみ(2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 開封後は袋の口を折り返して保管してください。開封後長期的になると、つやの消失、溶解等の変化があらわれることがあります。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。