


切り口



矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。

切取り後、段差がついて開けやすくなっています。

チャック

開封後はチャックを合わせ、密閉保管してください。

10枚入

サイズ: 10cm×14cm



のびのびサロンシップ®F 

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛 第3類医薬品

外用薬

経皮鎮痛消炎剤

角が丸いシップです。



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
製造販売元  久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
<http://www.hisamitsu.co.jp>

詳しい情報は
こちらへ▶ 

製造番号
使用期限

お客様相談室: ☎ 0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ 0120-149-931

第3類医薬品

販売名: のびのび®サロンシップ®F
(冷感)鎮痛消炎シップ剤

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

10枚入

サイズ: 10cm×14cm

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)	
サリチル酸グリコール	2.0g
ℓ-メントール	1.0g
ビタミンE酢酸エステル	1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4)開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、骨折痛、しもやけ




4 987188 151303

1E161T