

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

ぼうふうつうしょうさん

第2類医薬品

阪本漢法の防風通聖散錠

- 「防風通聖散」は漢方の原典といわれる中国の医書「宣明論」に収載されている处方です。
- 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、肥満症で便秘がちな方に用いられます。
- 高血圧や肥満に伴う症状(どうき、肩こり、のぼせ、便秘、むくみ)に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。　　むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。　　高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢、便秘

4. 1ヶ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

5. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

■用法・用量

成人（15才以上） 1回3錠

1日3回食前又は食間に微温湯又は水で服用してください。

* 15才未満は服用しないでください。

* 食間とは食後2~3時間を持ちます。

<用法・用量に関する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量

1日量9錠中 日局 防風通聖散エキス 3,000mg

成 分	分 量	成 分	分 量	成 分	分 量
日局 キキョウ	1,200mg	日局 トウキ	720mg	日局 ケイガイ	720mg
日局 ピャクジュツ	1,200mg	日局 シャクヤク	720mg	日局 ボウフウ	720mg
日局 カンゾウ	1,200mg	日局 センキュウ	720mg	日局 マオウ	720mg
日局 オウゴン	1,200mg	日局 サンシシ	720mg	日局 ショウキヨウ	240mg
日局 セッコウ	1,200mg	日局 レンギョウ	720mg	日局 カッセキ	1,800mg
日局 ダイオウ	900mg	日局 ハッカ	720mg	日局 ボウショウ	900mg

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、パレイショデンブン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、カルナウバロウ

<成分・分量に関する注意>

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4)ぬれた手で取り扱わないでください。また、ビンから錠剤を取り出した後はすぐに中栓をし、キャップをしっかりと締めて保管してください。（湿気は錠剤の色や形が変わることになります。）

(5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので、開封時に捨ててください。（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わる原因になります。）

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6423-0565（祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00）

製造販売元



株式
会社 阪本漢法製藥

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

S3
GOOO