

第2類医薬品

おなかに溜まった脂肪を落とす

有効成分

3000mg

阪本漢法の  
防風通聖散錠

ぼうふうつうしょうさんじょう

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

📞 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人  
(5) 発汗傾向の著しい人  
(6) 高齢者  
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人  
(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難  
(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状                                   |
|-------|---------------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ                             |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| 精神神経系 | めまい                                   |
| その他   | 発汗、動悸、むくみ、頭痛                          |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称             | 症 状                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎             | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 重篤な副作用<br>（アレルギー） | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                     |
| 肝機能障害             | 発熱、かゆみ、発疹・黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腸間膜<br>静脈硬化症      | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返されあられる。                                  |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢、便秘
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

阪本漢法の

防風通聖散錠

ぼうふうつうしょうさんじょう

有効成分

3000mg  
配合

おなかに溜まった

脂肪を  
落とす!

セルフメディケーション  
（税）控除対象

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、  
便秘がちな方の肥満症、高血圧や肥満に  
伴う症状（便秘、むくみ、のぼせ）

第2類医薬品

14日分 126錠

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の防風通聖散錠

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：  
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症  
（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

【用法・用量】 成人（15才以上） 1回3錠 1日3回  
食前又は食間に微温湯又は水で服用してください。

＊15才未満は服用しないでください。

＊食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量9錠中 日量 防風通聖散エキス 3,000mg

キキョウ1.2g、ビャクジュツ1.2g、カンゾウ1.2g、オウゴン1.2g、  
セッコウ1.2g、ダイオウ0.9g、トウキ0.72g、シャクヤク0.72g、  
センキュウ0.72g、サンシシ0.72g、レンギョウ0.72g、ハッカ0.72g、  
ケイガイ0.72g、ボウフウ0.72g、マオウ0.72g、ショウキョウ0.24g、  
カッセキ1.8g、ボウショウ0.9g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖水和物、バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、  
ステアリン酸Mg、タルク、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物（生薬）のエキスを using していますので、錠剤の色調等が  
多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して  
ください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

（服用の原因になったり品質が変わります。）

(4) ぬれた手で取り扱わないでください。

（水分は錠剤が変色する原因になります。）

(5) ビンの中の詰め物は開封時に捨ててください。

(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

（祝日を除く月～金曜日10:00～17:00）

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

阪本漢法の

防風通聖散錠

ぼうふうつうしょうさんじょう

有効成分

3000mg  
配合

おなかに溜まった

脂肪を  
落とす!

セルフメディケーション  
（税）控除対象

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、  
便秘がちな方の肥満症、高血圧や肥満に  
伴う症状（便秘、むくみ、のぼせ）

第2類医薬品

14日分 126錠

紙



4 987076 404689

製造番号

使用期限