

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

## 口腔・咽喉用薬

# つらい口内炎・のどの痛みに **オラキュア錠**

オラキュア錠は、抗炎症剤のトラネキサム酸を配合しています。炎症のもとに作用して、痛み・はれを鎮めるお薬です。

## ⚠【使用上の注意】



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。(けいれんがあらわれることがあります。)

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

(1) 甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬。(むくみ、血圧上昇及び筋疾患（ミオパチー）等が起こることがあります。)

(2) トラネキサム酸を含有する内服薬。(鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)

3. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。むくみ

(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脉炎等）、血栓症を起こすおそれのある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

口内炎、咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）

## 〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回、朝昼晩に服用してください。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	2錠
7歳以上15歳未満	1錠
7歳未満	服用しないこと

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているP.T.Pシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



## 〔成分・分量〕

6錠（成人1日服用量）中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量
トラネキサム酸	750mg
カンゾウ乾燥エキス（原生葉として990mgに相当）	198mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB <sub>6</sub> ）	50mg
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）	500mg

添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ショ糖脂肪酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄を含有します。

### 〈成分・分量に関する注意〉

- (1) 本剤に含まれているリボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）により、尿が黄色になることがあります。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合には、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤をぬれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 一度内袋（アルミ袋）を開封した後は、品質保持の点から開封後6ヶ月以内に服用してください。

### お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室  
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1  
☎ 0120-415-688 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元

日新薬品工業株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

製造販売元

アスクレ製薬株式会社  
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008