

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

口腔・咽喉用薬

つらい口内炎・のどの痛み

オラキュア錠

オラキュア錠は、抗炎症剤のトラネキサム酸を配合しています。炎症のもとに作用して、痛み・はれを鎮めるお薬です。

⚠️【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
(1)甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬。(むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります。)
(2)トラネキサム酸を含有する内服薬。(鼻炎用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等)
- 2.長期連用しないでください



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。むくみ
(6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

口内炎、咽頭炎・扁桃炎（のどのはれ、のどの痛み）

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回、朝昼晩に服用してください。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	2錠
7歳以上15歳未満	1錠
7歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



〔成分・分量〕

6錠（成人1日服用量）中に、次の成分を含有します。

成分	分量
トラネキサム酸	750mg
カンゾウ乾燥エキス（原生薬として990mgに相当）	198mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
L-アスコルビン酸ナトリウム（ビタミンCナトリウム）	500mg

添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ショ糖脂肪酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤に含まれているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります。
- (2) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合には、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 本剤をぬれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、表面が一部溶けて変色又は色むらを生じることがあります。）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 一度内袋（アルミ袋）を開封した後は、品質保持の点から開封後6カ月以内に服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎ 0120-415-688 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1