

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢 方 製 剤

第2類医薬品

ほうふうつうしょうさん

阪本漢法の防風通聖散錠ゴールド

「阪本漢法の防風通聖散錠ゴールド」は防風通聖散エキスを配合した漢方製剤です。体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症を治療するのに有効な薬剤です。

肥満症とは、肥満（体格指数 $BMI * \geq 25$ ）と判定され、肥満に起因する健康障害を合併するか、その合併が予測される場合で、医学的に減量を必要とする状態のことです。

そのような方には、毎日適度な運動を続けることや、バランスのよい食事を心がけること等で脂肪を減らすことに努めるとともに、本剤の服用をおすすめします。

* $BMI = \text{体重 (kg)} \div \text{身長 (m)} \div \text{身長 (m)}$



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢、便秘

4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでの（にきび）、肥満症

■用法・用量

成人（15歳以上） 1回4錠

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

* 15歳未満は服用しないでください。

* 食間とは食後2～3時間を指します。

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量

1日量12錠中 日局 防風通聖散エキス 5,000mg

成 分	分 量	成 分	分 量	成 分	分 量
日局 キキョウ	2g	日局 トウキ	1.2g	日局 ケイガイ	1.2g
日局 ビャクジュツ	2g	日局 シャクヤク	1.2g	日局 ボウフウ	1.2g
日局 カンゾウ	2g	日局 センキュウ	1.2g	日局 マオウ	1.2g
日局 オウゴン	2g	日局 サンシシ	1.2g	日局 ショウキョウ	0.4g
日局 セッコウ	2g	日局 レンギョウ	1.2g	日局 カッセキ	3g
日局 ダイオウ	1.5g	日局 ハッカ	1.2g	日局 ボウショウ	1.5g

より製した乾燥エキス

添加物：バレイシヨデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色調等が多少異なることがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) めれた手で取り扱わないでください。また、ビンから錠剤を取り出した後はすぐに中栓をし、キャップをしっかり締めて保管してください。（湿気は錠剤の色や形が変わる原因になります。）
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので、開封時に捨ててください。（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わる原因になります。）
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6423-0565（祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00）

製造販売元



株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12