

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：フジアローEXクリーム
(鎮痒消炎薬) 内容量：12g

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. **次の部位には使用しないこと** (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2)目の周囲、粘膜等 2. **顔面には、広範囲に使用しないこと** 3. **長期連用しないこと**

■ **相談すること**

1. **次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること** (1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)湿潤やただれのひどい人 2. **使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること** [関係部位：症状]皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 皮膚(患部)：みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 3. **5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先 ☎048-648-1118
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

02B100

効能・効果

皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量に患部に塗抹してください。

⊕用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の治療を受けること (3)外用にのみ使用すること

成分・分量 <100g中>

アレドニゾン古草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15g		
ジフェンヒドラミン	1.0g	アラントイン	0.2g
クロタミトン	5.0g	リドカイン	1.0g
トコフェール酢酸エステル	0.5g	イソプロピルメチルフェノール	0.1g
グリチルレチン酸	0.5g	添加物：白色ワセリン、ステア	
		リルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、パル	
		ミチン酸イソプロピル、ベヘニルアルコール、セトマクロゴール	
		1000、プロピレングリコール、ジメチルポリシロキサン、パラベン、	
		ジブチルヒドロキシトルエン、エデト酸Na、リン酸 含有	