



ゼリア新薬

コンタクトレンズ装着時の不快感、目の疲れに

サフィオ®コンタクト

SAFIO CONTACT

眼科用薬

【特徴】

- ソフト・O₂透過性・ハード・使い捨てすべてのコンタクトレンズ（カラーコンタクトレンズを除く）を装着したまま点眼できます。また、レンズをしていない時にもご使用頂けます。
- ビタミンB₁₂（シアノコバラミン）を配合した赤色の点眼薬です。
- 角膜保護成分（コンドロイチン硫酸エステルナトリウム）が、コンタクトレンズをしている時の目の不快な症状を鎮めます。
- タウリンが新陳代謝を促して目の疲れをいやします。
- 清涼化剤を配合していないソフトな差し心地の点眼薬です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

（必ず裏面もお読みください）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用にのみ使用してください。
- (4)液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。
- (7)カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。

〔成分〕

| 成分 | 分量 | はたらき |
|------------------------|-------|-------------------------------|
| シアノコバラミン (ビタミンB12) | 0.02% | 目に栄養を与え、新陳代謝を活発にして目の疲れをいやします。 |
| タウリン | 0.1% | |
| コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム | 0.1% | 角膜を保護して、目の不快な症状を鎮めます。 |

添加物：塩化カリウム、塩化ナトリウム、ソルビン酸カリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ヒアルロン酸ナトリウム、pH調節剤1成分、ホウ酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後はなるべく速やかに(3ヵ月を目安に)使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

サフィオはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11