

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



ゼリア新葉

ものもらい・結膜炎に スキットアイ® 抗菌

眼科用薬

[特徴]

目は常に外界からの刺激にさらされており、非常に敏感に反応します。

スキットアイ® 抗菌は、細菌感染によって起こるものもあり、結膜炎などに効果があるスルファメトキサゾールと、炎症やかゆみを抑えるアズレンスルホン酸ナトリウム水和物、クロルフェニラミンマレイン酸塩などを配合した目薬です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

*1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3～4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

ものもらい、結膜炎（はやり目）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

[用法・用量]

1回2～3滴、1日4～6回点眼してください。

<用法・用量に関する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したもののは使用しないでください。

(必ず裏面もお読みください)

- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 (4)点眼用にのみ使用してください。
 (5)定められた用法・用量を守ってください。
 (6)液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。
 もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

[成 分]

成 分	分 量	はたらき
スルファメトキサゾール	4.0%	持続性のサルファ剤で、細菌の感染で起こる眼病に効果を発揮します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の目のかゆみを抑えます。
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）	0.02%	ハーブ生葉（カミツレ）由来の消炎成分で、充血やかゆみ等の炎症を効果的にしのぎます。
コントロイチン硫酸エステルナトリウム	0.3%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。

添加物：ホウ酸、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、pH調節剤

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7)成分の水溶性アズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。
- (8)品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をビニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。



※「ものもらい」は、次のことを注意してください※

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足で体力が低下しているときに起こりやすいので疲労をさけ、睡眠を十分にとるよう心がけてください。）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

スキットアイはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11