

A
DHC ハルジクロラクシート


第2類医薬品

DHC ハルジクロラクシート

ジクロフェナクナトリウム配合

つらい痛みに
1日1回で
効果が持続

肩の痛み 腰痛
筋肉痛
関節痛 捻挫



7cm×10cm

全方向伸縮素材で
患部にフィット

貼りやすい3分割フィルム

14枚

第2類医薬品

◆成分・分量
膏体100g中

成 分

ジクロフェナクナトリウム

分 量

1g

添 加 物

として、スチレン・インブレン・スチレンプロック共重合体、
アクリル樹脂、スプーラン、流动パラフィン、イソステアリン酸、
タルク、メントール、BHTを含有します。

肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、捻挫などに

DHC ハルジクロラクシート

<経皮鎮痛消炎薬> 14枚(7枚×2袋/1枚:7cm×10cm)

第2類医薬品

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

◆ 使用上の注意 ◆

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 肝臓病を起したことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15才未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。

4. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 他の医薬品を使用している人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。

(5) 次の診断を受けた人。

消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ

(6) 次の医薬品の投与を受けている人。

ニューキノン系抗酸剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスボリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤

(7) 高齢者。

2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(ブケ、アカ)のような皮膚のはれい、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

用法・用量 プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

用法・用量に関する注意

- 1. 定められた用法・用量を厳守してください。
- 2. 1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていることを確かめてから使用してください。
- 3. 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 4. 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 5. 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 6. 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない涼気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4. 製品質保持のため、未使用分は袋に入れて、開口部のチャックを閉めて保管してください。
- 5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931



医薬品
相談室 tel. 03-3762-2581
受付時間 9:00~17:00(日・祝を除く)



DHC 製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1
0120-333-906 www.dhc.co.jp