

## DHC ハルジクロラクシート

第2類医薬品

B

## DHC ハルジクロラクシート

ジクロフェナクナトリウム配合

**つらい痛みに  
1日1回で  
効果が持続**

**肩の痛み 腰痛  
筋肉痛  
関節痛 捻挫**



7cm×10cm

**全方向伸縮素材で  
患部にフィット**

貼りやすい3分割フィルム

**14枚**

製造番号

001UD

使用期限

2022.7

第2類医薬品

◆成分・分量  
膏体100g中

成分	分量
ジクロフェナクナトリウム	1g

添加物として、ステレン-イソブチレン-ステレンブロック共重合体、アルペングリコルスクワラン、油酸アラビエン、インスティアリン酸、タルク、メントール、BHTを含有します。

セルフメディケーション  
税控除対象

# 肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、捻挫などに

DHC ハルジクロラクシート <経皮鎮痛消炎薬> 14枚(7枚×2袋/1枚:7cm×10cm)

第2類医薬品

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## ◆ 使用上の注意 ◆

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
1.次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)せんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (4)15才未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください。
  - (1)目の周囲、粘膜等。
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3)みずみし・たむし等又は化膿している患部。
- 3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
- 4.連続して2週間以上使用しないでください。

### 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)他の医薬品を使用している人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。
  - (5)次の診断を受けた人。  
消化性潰瘍、血栓塞栓症、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ
  - (6)次の医療品の投与を受けている人。  
ニーキノロン系抗酸剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、シクロスボリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤
  - (7)高齢者。
- 2.使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・かぶれ・はれ・痛み・刺激感・熱感・皮膚のあれ、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)・水疱・色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤・はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤・かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】 プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

## 用法・用量に関する注意

- 1.定められた用法・用量を厳守してください。
- 2.1回あたり、24時間を超えて貼り続けるなでください。さらに同じ患部に貼りかかる場合は、その貼付部に発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 3.本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 4.汗をかいり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 5.皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 6.同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。

## 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない温湿の少ない所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.品質保持のため、未使用分は袋に入り、開口部のチャックを閉めて保管してください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問い合わせ先

0120-149-931



医薬品  
相談室

tel. 044-233-2029  
受付時間 9:00~17:00(日・祝日を除く)

製造販売元  
株式会社ディーエイチシー  
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp