

Vロート アクティブ PREMIUM

販売名：Vロートアクティブプレミアム **第2類医薬品** 15mL

◆製品特徴

「Vロートアクティブプレミアム」は、眼疲労時に起こる視覚機能の低下に着目した“視覚機能再活性化処方”を採用。涙成分であるムチンの分泌を促進し涙を安定化させるビタミンAや、遠近調節機能を改善し視覚機能を再活性化させるネオスチグミンメチル硫酸塩を基準内最大量配合*しました。さらに、瞳細胞に活力を与える4種の代謝促進成分を配合しています。年齢などによる眼疲労、かすみ*症状に効果を発揮する「Vロートアクティブプレミアム」は、アクティブ世代の瞳に活力を与え、元気で健やかな瞳をサポートするプレミアム目薬です。

*目やにの多いときなど ※一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合

フリー
アングル
ノズル®



どの角度からでもさしやす!簡単にアイケアできて便利です。

ワンタッチ式
スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人：緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

成分

有効成分	配合量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	50,000単位/ 100mL	涙成分(ムチン)の分泌を促進し、涙を安定化させ、角膜表面を保護して、目の疲れを改善します。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01%	血管を収縮させて目の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	遠近調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンの働きを抑え、目の炎症・目のかゆみを抑えます。
ビタミンB6	0.01%	新陳代謝を促進して、目の疲れを改善します。
酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.045%	血行を促進して、目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.5%	細胞呼吸を促進して、目の疲れを改善します。
タウリン	1%	新陳代謝を促進して、目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1%	角膜表面を保護して、目の疲れを改善します。



※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、塩化Na、エデト酸Na、BHT、塩酸ポリヘキサド、 β -メントール、グラニオール、ユーカリ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、pH調節剤を含有します。

効能・効果

- 目のかすみ
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 目の疲れ
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 結膜充血
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目のかゆみ
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)