

湿疹・かゆみ・虫さされに

第②類医薬品

MEDI'S ONE

湿疹・皮膚炎治療薬

シオノギ[®]M軟膏EX

シオノギヘルスケア

シオノギM軟膏EXは、アンデラッグステロイドを含む9つの成分を配合し、湿疹、かゆみ、虫さされなどにすぐれた効果を発揮する軟膏剤です。皮膚の保護作用の高い軟膏タイプです。

……特徴……

- ◇ アンデラッグステロイドの一つである「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル」が湿疹、かゆみなどをともなう炎症をおさえます。
- ◇ かゆみ止め成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩等、9種類の成分を配合し、湿疹、かゆみ、虫さされといったつらい症状に対し効果を発揮します。

アンデラッグステロイドとは

皮膚表面の患部で効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に変化する性質をもつ成分です。



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむしなど または化膿している患部
 - (2) すり傷、切り傷
 - (3) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分など
2. 次の場合には使用しないでください
 - (1) 美容目的の使用
 - (2) かぶれ防止のための化粧下、ひげそりあと
 - (3) にきび
 - (4) 赤ら顔（赤鼻）
 - (5) おむつかぶれ（湿疹以外の原因によることが多い）
3. 顔面には広範囲に使用しないでください
4. 長期連用しないでください
よくなれば中止してください。だらだらと無用に長く使わないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむしなどの白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

湿疹、かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん

……用法・用量……

1日数回 適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) ごしごしすりこまないで、のばすようにうすくぬってください。
(あつめにぬっても効きめが高まるわけではありません。)
- (6) 始めは1日に2～3回塗り、よくなるにつれて回数をへらしてください。
- (7) 塗布後、その部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。

……成分・分量……


シオノギM軟膏EXは、白色～微黄色の軟膏で、1g中に次の成分を含有しています。

成 分	含量 (1g中)	はたらき
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (PVA)	1.5mg	アンテドラッグステロイドの一つで、湿疹・かゆみなどをともなう炎症をおさえる
グリチルレチン酸	5mg	炎症をおさえる
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみをおさえる
クロタミトン	50mg	皮膚に軽い灼熱感を与え、かゆみをおさえる
リドカイン	20mg	知覚神経を麻痺させ局所のかゆみを緩和する
トコフェロール酢酸エステル	5mg	皮膚の末梢血管の血流を改善し、治療効果を高める
アラントイン	2mg	傷んだ皮膚組織の修復を助ける
イソプロピルメチルフェノール	1mg	皮膚への殺菌作用により、二次感染による悪化を防ぐ
サリチル酸グリコール	10mg	局所刺激作用により、かゆみをおさえる。 また、末梢血管の血流も改善する

添加物として マクロゴール、クエン酸水和物、香料、精製水を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話:大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間:9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

®:登録商標

企画元

株式会社ツルハグループ・アマーチャンダイジング

販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元

新生薬品株式会社

富山県中新川郡上市町横越16番1