

〔使用上の注意〕

相談すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合、2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔成分・分量〕 1日量1本(50mL)中
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)…5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)…2.55mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)…10mg、ニコチン酸アミド…25mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム…200mg、タウリン…500mg、無水カフェイン…50mg、ローヤルゼリー抽出液…50mg(ローヤルゼリー50mgに相当)

添加物：白糖、アセスルファムK、DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、カラメル、バラベン、エタノール、香料、プロピレングリコール、ミツロウ、エチルパニリン、グリセリン、パニリン(アルコール0.15mL以下)
●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50

ガラス：瓶 金属：キャップ

リキセ-TRV

疲労回復・栄養補給に



タウリン・ローヤルゼリー
フルスルチアミン配合

指定医薬部外品 50mL

販売名：リキセ-TRV

〔効能・効果〕○体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善○疲労の回復・予防○病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。●用法・用量を厳守すること(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。●本剤は、まれに沈殿や浮遊物を生じることがある。よく振って服用すること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

使用期限

製造番号



4

AL02