

# くしゃみ・鼻みず リコリプラス点鼻薬クール

## 鼻づまりに 鼻炎用点鼻薬

鼻みず、鼻づまりは、かぜ、又は花粉やほこりなどが原因で、鼻の粘膜にはれや充血が生じたときに多くみられます。リコリプラス点鼻薬クールはスプレー式で、鼻腔内に一定量のお薬を噴霧するため、有効成分が均一にひろがり、不快な鼻炎症状を緩和し、鼻の通りをよくします。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 長期運用しないでください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、線内障

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

##### 3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

## 【用法・用量】


次の量を、鼻腔内に噴霧してください。

年 令	1回量	1日使用回数
成人(15才以上) 及び7才以上のお子様	1~2度ずつ噴霧	3時間以上の間隔をおいて、6回以内
7才未満		使用しないこと

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

### (使用方法)



### 【成分・分量】100mL中

成 分	分 量	は た ら き
ナファゾリン塩酸塩	50mg	はれや充血を抑え、炎症を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	くしゃみ、鼻みずなどのアレルギー症状を緩和します。
リドカイン	300mg	かゆみ、痛みを抑え、不快感をやわらげます。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻腔内の殺菌・消毒をし、炎症の改善を助けます。

添加物としてpH調節剤、等張化剤、l-メントールを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わるので防ぐため)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願ひいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100(代表) 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>