

第3類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

よくい にん
薏苡仁錠シンワ S

⚠️【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

4. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】

本品 1 日量（9 錠）中
ヨクイニンエキス……………720mg
（原生薬換算量 18000mg）
「日局」ヨクイニン末……………500mg
なお、添加物としてカルメロースCa、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、セルロースを含む。

【効能・効果】

いば、皮膚のあれ

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用する。
（食間とは、食後 2 ～ 3 時間を指します。）

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	3 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	2 錠	
7 歳未満 5 歳以上	1 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

*【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号
電 話：0120-019-776
受付時間：9 時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木 3 丁目46番16号
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>

* 発 売 元

伸 和 製 薬 株 式 会 社

東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地

