

阪本漢法の 葛根湯

かぜのひきはじめに

内服液2

朝夕 1日2回 第2類医薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

処方 満量

かぜの
ひきはじめ
頭痛
鼻かぜ
肩こり

朝夕 1日2回
よく振って服用

眠くなる成分は入っていません

45mL×2本

第2類医薬品

ガラス：瓶
金属：キャップ



第2類医薬品

阪本漢法の
葛根湯

かぜのひきはじめに

内服液2

日本薬局方 葛根湯エキスの
生薬量最大 25g処方
を全量配合した内服液剤

本来の葛根湯の製法を
守り製造しておりますので、
よく振って服用してください。

朝夕 1日2回
よく振って服用

眠くなる成分は入っていません

S2
A000

服用前にこの箱の
説明文書を必ず
お読みください。

開封口

漢方製剤

第2類医薬品

【販売名】阪本漢法の葛根湯内服液2

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人	(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人	(8) 次の症状のある人
(3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)	むくみ、排尿困難
(4) 胃腸の弱い人	(9) 次の診断を受けた人
(5) 発汗傾向の著しい人	高血圧、心臓病、腎臓病、
(6) 高齢者	甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1日量2本(90mL)中 日局 葛根湯エキス 8.3g
 日局 カッコン8.0g、日局 マオウ4.0g、日局 タイソウ4.0g、日局 ケイヒ3.0g、
 日局 シャクヤク3.0g、日局 カンソウ2.0g、日局 ショウキョウ1.0g
 より製した軟エキス
 添加物：白糖、D-ソルビール、スクラロース、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、
 パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、香料、バニリン

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期(汗をかいていないもの)、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、
手や肩の痛み

【用法・用量】
1日2回 朝夕、食前又は食間
によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1本	1日2回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 食間とは食後2～3時間を指します。(3) 本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じますが、よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】

☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



製造番号

使用期限