

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

⚠ 使用上の注意

🗣️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢、便秘。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、食欲不振

Calcium

シーエーアップ® グレープフルーツ味

指定医薬部外品

500mL

用法用量

次の1回量を1日1～2回服用する。
(服用には添付の計量コップを使用ください。数字の単位はmLです。)

年齢	1回量
成人(15才以上)	20mL
11才以上 15才未満	15mL
7才以上 11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5mL
1才以上 3才未満	2.5mL
1才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を守ること。(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取などに注意すること)
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

40mL(成人1日量)中
グルコン酸カルシウム水和物……………3000mg
(カルシウムイオンとして268.1mg)

添加物:クエン酸水和物、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リボフラビンリン酸エステルNa、プロピレングリコール、pH調整剤、香料。

開栓時に
記入して
ください。

開栓年月日

品質保持の点から、開栓後3週間以内に
服用すること

開栓後要冷蔵

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 服用のつどフタをよくしめること。
5. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビンの方に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
6. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
7. ビンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
8. ビンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
9. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

製造番号 ◆ 使用期限(年.月)



キャップ 中栓
フィルム 計量コップ
ガラス:ビン

AS2209

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

お客様相談窓口 TEL 03-3527-3690

受付時間:午前10時～12時、午後1時～5時

(土・日・祝日を除く)