



第3類医薬品

販売名：シーミーホワイト



ここからお切りください。

開封後チャックを閉じて保管してください。



b.glen
PHARMA

販売名：シーミーホワイト 第3類医薬品

L-システイン配合 ビタミンC主葉製剤 180錠

この説明書は服用前に必ずお読みください。



△【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 下痢、便秘

4. 1ヵ月服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量に関連する注意】

(1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

(2) 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。

【効能・効果】

● 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

● 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

● 次の場合のビタミンCの補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を朝晩に水またはお湯にて服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	7歳以上 15歳未満	7歳未満
1回量	3錠	1錠	
服用回数	1日2回		服用しないこと

【成分・分量】1日量(6錠中)

アスコルビン酸(ビタミンC) 1000mg
L-システイン 240mg
リボフラビン(ビタミンB₂) 6mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 12mg
コハク酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE) 50mg
添加物として、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含む。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

4. 袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は、品質保証の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

6. 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないでください。

【発売元】

ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社

東京都港区浜松町1-12-10

製品のお問い合わせ先／お客様窓口

☎ 0120-461-289 www.bglenpharma.com

【受付時間】10:00～12:00、13:00～15:30

(土・日・祝日を除く月曜から金曜)

【製造販売元】

至誠堂製薬株式会社

奈良県御所市茅原220-1

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 版No.1

SMHB



4 589967 133045

使用期限

製造番号