

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの

# 鼻づまり 鼻みずに エナジー点鼻薬

第2類医薬品

## 使用方法



キャップを  
とりず。



容器をもち、  
液が噴霧する  
まで、はね部を  
2~3回押し  
てください。



静かに息を吸  
い込みながら、  
鼻腔内に噴霧  
してください。

〔液が残っている音は出ない時〕

液を吸い上げる  
チューブは右図のような  
構造になっています。  
緩やかなカーブが  
ついているので  
唇をかたむけず  
お使い頂くともだなく  
お使いいただけます。



- 唇を横にして使用すると、薬液が逆流になりませんので、必ず上向きに使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等で拭き取り、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

## 用法・用量に関する注意

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)点鼻用におのみ直し、内服しないでください。

# アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの 鼻づまり 鼻みずに エナジー点鼻薬

ナファゾリン塩酸塩

クロルフェニラミン  
マレイン酸塩

## エナジー 点鼻薬

患部に  
直接作用



30mL

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの  
鼻づまり  
鼻みずに  
エナジー点鼻薬

第2類医薬品

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの

## 成分・分量

成分	分量 100mL中	作用
ナファゾリン 塩酸塩	50mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	500mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過剰を抑えます。
ベンゼトニウム 塩化物	20mg	鼻粘膜を殺菌・消毒します。

添加物：グリセリン、エタノール、pH調整剤、香料

## 保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

## 消費者相談窓口

本剤についてのお問い合わせはお買い求めのお店または下記までご連絡ください。

製造販売元

**KOA** コーア製薬株式会社  
横浜市港北区実業町2-17-5

コーア製薬株式会社 [お客様相談室]  
☎045-562-6871  
時間9:00~17:00(土・祝日を除く)

副作用報告致済制度☎0120-149-931



4 987876 010103



ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 使用上の注意

⊗してはいけないこと  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹、赤み、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

## 効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水(鼻汁過剰)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

## 用法・用量

成人(15歳以上)及び7歳以上の子供：1回1~2度ずつ、1日1~5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

1801-TYS

ET-1

製造番号

使用期限