

□陣陣▲

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの

# 鼻づまり 鼻みずに エナジー点鼻薬

第2類医薬品

## 使用方法

- ① キャップをとりず。
- ② 容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2~3回押ししてください。
- ③ 静かに息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。

## 【液が残っている音はするが出ない時】

液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついているので容器をかむむけずお使い頂くこと、むだなくお使いいただけます。



- 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きに使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等で拭き取り、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

## 用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻薬にのみ使用し、内服しないでください。

# アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの 鼻づまり 鼻みずに エナジー点鼻薬

ナファゾリン塩酸塩

クロルフェニラミン  
マレイン酸塩

## エナジー 点鼻薬

患部に  
直接作用



30ml

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎などの  
鼻づまり  
鼻みずに  
エナジー点鼻薬  
第2類医薬品

## 成分・分量

| 成分              | 分量<br>100mL中 | 作用                                 |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| ナファゾリン塩酸塩       | 50mg         | 鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 500mg        | 抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多を抑えます。         |
| ベンゼトニウム塩化物      | 20mg         | 鼻粘膜を殺菌・消毒します。                      |

添加物：グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

## 消費者相談窓口

本剤についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

製造販売元  
コーアバイオテックベイ株式会社  
神奈川県横浜市港北区日吉7-15-13  
コーアバイオテックベイ株式会社【お客様相談室】  
☎045-562-5871  
時間9:00~17:00(土・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

セルマデケーション

税 控 除 対 象



ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

**× してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

## ⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 鼻    | はれ、刺激感    |

3. 3日間位使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭痛（頭が重い）

## 用法・用量

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回1~2度ずつ、1日1~5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

2202-TYS



製造番号

使用期限