

ロート製薬

和漢錦  
わかんせん®

# リハビット

## 補中益気湯

ほちゅうえつきとう

**【効能・効果】**体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

**【用法・用量】**次の量を1日2回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

※食間とは、食後2～3時間を指す。


年齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
7才以上15才未満	3錠
5才以上7才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〈販売名〉リハビット

第2類医薬品



切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

漢方製剤 80錠

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

● まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1カ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【成分・分量】**8錠中 補中益氣湯エキス(1/2量)2370mg(ニンジン2.0g、ビャクジュツ2.0g、オウギ2.0g、トウキ1.5g、チンピ1.0g、タイソウ1.0g、サイコ1.0g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.25g、ショウマ0.5gより抽出)を含む。添加物として、二酸化ケイ素、カルメロースCa、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、タルク、結晶セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000、カルナウバロウを含む。※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

**【保管及び取扱い上の注意】**(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

ココロート・パーク

「ココロートパーク」に、あなたの貴重なご意見をお届けください。



<https://coco.rohto.com/p/?159802>

副作用被害救済制度の問合せ先：0120-149-931

発 売 元：ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク：06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地

使用  
期限

製造  
番号



15980218D