

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

おなかの脂肪が気になる方の肥満症に

ぼうふうつうしょうさん

DHC 漢方 防風通聖散エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方防風通聖散エキス錠は、中国の古典医学書「せんめいろん宣明論」に収載されている防風通聖散のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。おなかまわりの脂肪が多く、便秘がちな方の肥満症や、肥満に伴うむくみ・便秘などに効果があります。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

裏面も必ずお読みください。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢、便秘
- 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、
 湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

■ 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠	1日3回
5才以上15才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

9錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる防風通聖散エキス(1/2量)2750mgを含有します。

成分	分量
トウキ	0.6g
シャクヤク	0.6g
センキュウ	0.6g
サンシシ	0.6g
レンギョウ	0.6g
ハッカ	0.6g
ショウキョウ	0.2g
ケイガイ	0.6g
ポウフウ	0.6g
マオウ	0.6g
ダイオウ	0.75g
無水ポウシヨウ	0.375g
ビャクジュツ	1.0g
キキョウ	1.0g
オウゴン	1.0g
カンゾウ	1.0g
セッコウ	1.0g
カッセキ	1.5g

添加物として、ステアリン酸Mg、タルク、無水ケイ酸、セルロース、ヒプロメローズ、カラメル、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウを含有します。

【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
- 本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029
受付時間 9:00~17:00(日・祝日を除く)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp