

漢方薬

ビラクス錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

＜効能又は効果＞

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

＜用法及び用量＞

次の量を1日2回朝夕、食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	5錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

用法・用量を厳守してください。

＜成分及び分量＞

ビラクス錠の1日量（10錠）中には下記生薬より得た辛夷清肺湯乾燥エキス（50%量）2.5gを含む。

シンイ	1.0g	バクモンドウ	2.5g
チモ	1.5g	セッコウ	2.5g
ビャクゴウ	1.5g	ショウマ	0.5g
オウゴン	1.5g	ビワヨウ	1.0g
サンシシ	1.5g		

添加物として、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、タルクを含有します。

＜保管及び取扱い上の注意＞

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。
大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574
電話 (0745) 22-3601
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574