

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎冷感パップ剤

メタクレスト 0.5%

第2類医薬品

特長

- 肩・腰・関節などの痛みにすぐれた効果を発揮する鎮痛・消炎パップ剤です。
- インドメタシンが患部に直接浸透し、痛みの原因プロスタグランジンの発生を抑えます。
- 伸縮性に富んだ不織布を使用しているため、すぐれたフィット感が得られます。

△ 使用上の注意

- ☒ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]
1. 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)ぜんそくを起こしたことがある人
(3)15歳未満の小児
 2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口 (3)みずむしめたむし等又は化膿している患部
 3. 長期連用しないでください。

▢ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------------|
| 皮ふ | 発疹、発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

腰痛、筋肉痛、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

セルフメディケーション

税控除対象

用法・用量に関する注意

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
3. 汗をかいていたり、患部がぬれていたりする時は、よく拭き取つてから使用してください。
4. 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
5. 連続して2週間以上使用しないでください。

成分・分量

〈膏体100g(1000cm²)中〉
インドメタシン 0.5g
添加物:ベンジルアルコール、ポリソルベート80、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、酒石酸、エデト酸Na水和物、トコフェロール酢酸エステル、ビタミンC、L-メントール、カオリン、酸化チタン、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、1,3-ブチレングリコール、ヒマシ油、香料

保管及び取り扱い上の注意

1. 高温・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
〔誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。〕
4. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
5. 開封後は、未使用分を袋に戻しチャックを閉じて保管してください。
また、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

[包装] 32枚入
(8枚入×4袋/1枚:10cm×14cm)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

企画元 株式会社ツルハグループマーチャンダイジング

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4の68の1

※寸法イメージ図

MADE IN JAPAN

お問い合わせ先:株式会社タカミツ 電話0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間 [9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く]



製造番号:

使用期限:



4 571292 677721