

富山常備薬

L-システイン  
アスコルビン酸(ビタミンC)  
ニコチン酸アミド  
リボフラビン(ビタミンB2)

有効成分

# しみ・そばかす 飲んで効く医薬品

錠・中身

30日分 180錠

## キミエホワイト

第3類医薬品

### KIMIE WHITE

この線の上をお切りください

この線の上をお切りください

開封後はチャックをしっかりと閉じて保管してください

服用前に、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

L-システイン配合錠 第3類医薬品

販売名：キミエホワイト

【成分・分量】 1日量(6錠)中

L-システイン……………160mg  
アスコルビン酸(ビタミンC)……………500mg  
ニコチン酸アミド……………60mg  
リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)……………12mg

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム末、ゼラチン、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca及びカルナウバロウを含有する。

【成分・分量に関連する注意】

- 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるもので心配ありません。
- ビタミンCの服用により、尿および大便の検査値に影響を及ぼす場合がありますので、尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせしてください。

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
3. 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

次の量を食後服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	3回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

△使用上の注意

■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ④服用の都度、チャックをしっかりと閉じてください。(吸湿し品質が変わることがあります。)
- ⑤使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- ⑥袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。

お問い合わせ 株式会社富山常備薬

☎0120-432-093

受付時間：9時～18時(年中無休)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

五洲薬品株式会社

富山県富山市花園町1-1-5

発売元

株式会社富山常備薬

富山県富山市丸の内1-8-17



4 580544 060853

使用期限



PE, PET, M

®登録商標 OS4164230120

製造番号