

バストトップなどのムズムズかゆみ・皮膚炎治療薬

バストトップケア®

販売名：バストトップケア

●こんなお悩みありませんか？

バストトップがムズムズかゆい！
だけど、人前では恥ずかしくて
かくどころか、触ることさえできない！




一度かき始めると、我慢し
きれず、強くかいてしまい、
傷つけてしまうことも…

そんな方のためのバストトップのかゆみ治療薬、それが「バストトップケア」です。

●バストトップがムズムズかゆくなるのはなぜ？

バストトップは体の中でも皮膚が薄く、刺激に敏感な部位です。そのため、下着・衣服でスレる・ムれるなどのちょっとした刺激でも炎症が起こり、「ムズムズとしたかゆみ」が起きやすくなります。かゆみを我慢できずにかいてしまうと、皮膚が傷ついて、ますます刺激を敏感に感じるようになり、さらにかゆみが強くなってしまいます。



●バストトップのかゆみに、「バストトップケア」

ムズムズかゆみを感じる・かゆみを我慢できない時は、かかずに「バストトップケア」を塗って、すばやくしっかり治療しましょう。「バストトップケア」は、バストトップのかゆみを考えて開発された、こだわりの3つの処方特長をもつ、かゆみ治療薬です。

処方特長 1 かゆみをすばやく鎮める、しっかり抑える

心地よい清涼感
(*l*-メントール、*dl*-カンフル)
→かゆみをすばやく鎮めます。

かゆみを抑える
(ジフェンヒドラミン)
かゆみの元となる炎症を抑える
(グリチルレチン酸)
→2つのはたらきで、かゆみを
しっかり抑えます。



処方特長 2 皮膚の修復を助ける

傷ついた皮膚に元気を与え、
かゆみを感じやすくなって
いる皮膚の修復を助けます
(パンテノール)。

処方特長 3 皮膚が薄く敏感な バストトップにやさしい使い心地

着色料・香料・鉱物油を配合していません。
下着につきにくいサラッとしたべたつかない
使用感と、バストトップに塗りやすい、のび
のよさにこだわって仕上げました。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、ただれ、しっしん、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合（充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等）には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)粘膜部分には使用しないでください。

授乳中の方がご使用になる場合は、授乳前に本剤をよく拭き取ってください。

成分とそのはたらき

有効成分（100g中）

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみ原因物質（ヒスタミン）のはたらきをブロックし、起きているかゆみをしっかり抑えます。
ℓ-メントール	5.0g	心地よい清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
dℓ-カンフル	1.0g	心地よい清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	かゆみの元となる炎症を抑えます。
パンテノール（プロビタミンB5）	1.0g	皮膚の正常なはたらきを助けます。

添加物としてエデト酸Na、オクチルドデカノール、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、1,3-ブチレングリコール、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、パラベンを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限（ケース及びチューブに西暦年と月を記載）をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

かゆみをくり返さないためのポイント

サイズや素材の合っていない下着はスレの原因にもなりますので、適した下着を身に着けているか確認しましょう。ご自分で判断できない場合は、下着販売店などで確認してもらうことをおすすめします。

お子さまが誤ってバスタップケアを口にした場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

バスタップケア相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0019（電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00）

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SG01