

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

りょうけいじゅつかんとう  
**苓桂朮甘湯錠OM**



**【使用上の注意】**

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【成分・分量】** 本品1日量(8錠)中

「日局」ブクリョウ……3.0g 「日局」ビャクジュツ……1.5g

「日局」ケイヒ……2.0g 「日局」カンゾウ……1.0g

上記生薬より得た苓桂朮甘湯エキス(1/2量)1000mgを含む。

なお、添加物としてクロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、タルク、無水ケイ酸、セルロースを含む。

**【効能・効果】** 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：

立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

**【用法・用量】** 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	2回
15歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないでください	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

\*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4  
電 話：0120-019-776  
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

\*発 売 元 **伸和製薬株式会社**  
東京都中央区日本橋小伝馬町13-4  
製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574番地

